

Эзофагогастродуоденоскопия

Подготовка к исследованию

Исследование проводится строго натощак!

Последний прием пищи накануне вечером не позднее 19.00.

Ужин должен быть лёгким!

Если пациент постоянно принимает какие-либо препараты, их нужно принять за 4 часа до исследования, запив небольшим количеством воды (не больше 50,0мл!)

Если пациент принимает препараты влияющие на свертываемость крови (антикоагулянты: гепарин, натрия гидроцитрат, неодикумарин, синкумар; антиагрегантные средства: ацетилсалициловая кислота, дипиридамол, пентоксифиллин, тиклопидин), то необходимо накануне проконсультироваться с врачом, назначившим эти лекарственные средства, с решением вопроса о предстоящем исследовании с возможной биопсией.

Пациентам с эпилепсией и судорожными состояниями выполнение ЭГДС показано только в условиях внутривенного наркоза!

Пациентам с аритмией, перенесенным инфарктом миокарда, инсультом головного мозга следует накануне проконсультироваться с кардиологом.

Пациентам с сахарным диабетом необходимо записаться на ЭГДС на утренние часы и взять принимаемые препараты с собой (таблетированные формы, инсулин). Необходимо проверить уровень глюкозы крови утром.

Пациентам с бронхиальной астмой необходимо взять с собой ингалятор, которым пользуется постоянно.

Следует информировать врача об имеющихся заболеваниях сердца или легких, перенесенных ранее операциях, а также о приеме лекарств для разжижения крови.

В случае наличия любой аллергической и иной непереносимости лекарственных препаратов необходимо проинформировать об этом врача-анестезиолога и/или врача-эндоскописта.